

Bonus8-traitements systémiques

Méthotrexate

- **Bilan pré-thérapeutique (4)**
 - **Hépatique:** BHC avec transaminases / sérologies **VHB-VHC**
 - **Pulmonaire:** radiographie thorax / **EFR** avec DLCO (cf PID)
 - **Tératogène:** DDR / contraception / **hCG** plasmatiques
 - **Hémato:** NFS-plaquettes / créatinine / albumine
- **Modalités et mesures associées**
 - prise hebdomadaire: **1x/S** / dose initiale: **10mg/S** / **PO** (IM ou SC en cas d'échec)
 - Acide folique (**Spéciafoldine®**) 1x/S isodose à distance du MTX
 - **Contraception** orale si non ménopausée (+ 3M post-MTX)
 - **Vaccination** anti-grippale et anti-pneumocoque
- **Effets secondaires (4)**
 - **Hématotoxicité:** cytopénies (NFS-P 1x/M et Folates)
 - **Hépatotoxicité:** hépatites (BHC 1x/M et sérologies **VHB-VHC** au début)
 - **Toxicité pulmonaire:** **PID** / fibrose (RTx et EFR à l'instauration)
 - **Tératogénicité:** hCG et **contraception** si femme jeune (**A savoir !**)
 - **Autres:** toxicité digestive / alopecie..
- **Surveillance**
 - NFS et bilan hépatique (1x/M) / hCG et RTx réguliers
 - **!! Arrêt immédiat du MTX si**
 - Cytopénie: P < 100 000/mm³ ou leucocytes < 4000/mm³
 - Clinique: **fièvre** / toux / dyspnée

Anti-TNF α

- **Bilan pré-thérapeutique**
 - **Antécédents:** [BK / néoplasie / SEP / IC / auto-immunité] / foyer infectieux
 - **BK:** IDR et radiographie thorax +/- BK-tubage ou ECBC si crachat (**A savoir !**)
 - **Bilan infectieux:** EPP-NFS / VHB-VHC et VIH / ECBU +/- sinus-panoramique
- **Modalités et mesures associées**
 - En **parentéral:** infliximab (Rémicade®) en IV / Etanercept en SC
 - Prescription hospitalière seulement / en association avec MTX dans PR
 - **Contraception** indispensable si femme en âge de procréer
 - **Vaccination** anti-grippale et anti-pneumocoque
- **Effets secondaires**
 - **Réactivation d'une tuberculose (A savoir !)**
 - Interrogatoire: rechercher atcd / contagé / FdR
 - IDR et radio thorax systématiques +/- BK tubage ou ECBC si ≥ 1 positif
 - Si IDR positif (> 5mm): INZ + RMP pendant 3 mois
 - **Autres effets secondaires**
 - Susceptibilité aux infections à pyogènes ++
 - Risque d'affections démyélinisantes (SEP)
 - Réactivation d'un cancer (lymphome)
 - Insuffisance cardiaque
 - Tératogène
- **Surveillance**
 - Clinique ++ / IDR-RTx au moindre doute

Interféron (IFN α)

- **Bilan pré-thérapeutique**
 - ECG / **TSH** - Ac anti-TPO / hCG si femme jeune / AAN / anti-ML et LKM1
 - Consultation **psychiatrique:** systématique / ophtalmo: si xérose
- **Contre-indications**
 - grossesse / IRC / dysthyroïdie / dépression (risque suicidaire)
- **Modalités et mesures associées**
 - **IFN-PEG** injection SC 1x/S
 - Paracétamol avant les injection d'IFN car syndrome pseudo-grippal
 - Contraception indispensable si femme en âge de procréer
- **Surveillance**
 - Tolérance de l'interféron: [syndrome **dépressif - dysthyroïdie**]

